

OTC PRESCRIPTIONS

LAXATIVES

Lactulose (syrup) صغيرة 5 L/E ملعقة 3 مرات يومياً

Picolax (drops) 2L/E الحامل و الأطفال 10 نقط يومياً

Enemax

Glycerin (supp) Ad , PED 1L/E للرضع

Laxel (eff) 3L/E

Nassar (tab) 1.5L/E

Prostigmine (tab) 3L/E لضعف حركة الأمعاء

الإسهال

Antinal (cap , susp) 5L/E قرص 3 مرات يومياً

Flagyl (susp , tab) 6L/E قرص 3مرات يومياً لمدة 7 أيام

Entocid - H (tab) للإسهال مع المغص

Furazol (susp , tab) 7 أيام ملعقة 3 مرات أو قرصين كل 8 ساعات 7 أيام

الإسهال عند الرضع

kapect susp ملعقة 3 مرات يومياً

smecta 1/2 كيس علي 10 سم ماء

spasmotal drops 3مرات يومياً

Rehydrane packet

الإسهال البكتيري في الأطفال (إسهال الصيف):

Septazole susp ملعقة كل 12 ساعة بعد الأكل

Antinal susp ملعقة 3 مرات بعد الأكل

Pyral syrup 3مرات يومياً

عسر
الهضم

Spasmo amrase (tab)

Spasmodigestin (tab)

Zymogen forte (tab)

Irritable bowel syndrome:

Brane tab قرصين 3 مرات يومياً قبل الأكل بنصف ساعة

Librax قرص 3 مرات يومياً (علبة واحدة)

Colona قرص 3 مرات قبل الأكل بنصف ساعة

الانتفاخ

Primperoxane (tab) 3LE
 Disflaty (tab)
 Mentothicone (cap)
 Meteospasmyl (cap) 13LE

المغص والانتفاخ عند الأطفال:

Visceralgin syrup عند اللزوم
 Simethicone susp ملعقة 3 مرات
 Postine digestive syrup ملعقة كبيرة 3 مرات
 : المغص و الانتفاخ عند الرضع
 Gripe water syrup 1/2 ملعقة 3 مرات
 Spasmotal drops ملعقة 3 مرات
 Simethicone drops ملعقة 3 مرات بعد الرضاعة

إضطرابات القولون

Colona (tab) 10LE
 Tritone (tab) 1x3

المغص

Visceralgin (syrup) 1x3
 Buscopan Plus (tab)
 Spasmofen (amp)
 : للأطفال و الرضع
 Baby quiet (syrup)
 Baby rest (drops)
 Spasmotal (drops)

Renal colic :

Spaspmfen amp
 Uricol كيس علي نصف كوب ماء
 Rowatinex cap كبسولتين 3 مرات قبل الأكل

Renal, biliary drugs

Oxalate $\Rightarrow$ in urine analysis :

Epimag (sachets) كيس علي نصف كوب ماء 3 مرات يوميا

Lower UTI :

Uvamin (mild) (cap) 10LE كبسولة كل 6 ساعات لمدة 5 أيام

UTI : Noracin 400 (severe^{*}) (10 tab) 18 LE قرص كل 12 ساعة بعد الأكل لمدة 7 أيام

*severe if pus cells > 30 /HPF

القئ والغثيان

Cortigen B6 (amp) *ad, ped* 4 LE

Vomistop (cap) قرص قبل النوم أو عند اللزوم

Primperan (Tab, amp) قرص قبل الأكل بنصف ساعة 3 مرات يومياً
(hiccup)

الحمل:

Ezadoxine قرص قبل النوم

Dizirest B 6 (1ST 3 Months)

***Dramenex** (sultan) (cap) قرص 3 مرات يومياً لدوار البحر و الترجيع والغثيان عند المسافرين

الحموضة

Epicogel (mucogel) (susp) ملعقة كبيرة 3 مرات يومياً مضاد للإنتفاخ

Zantac (tab) (300 1x1 , 150 1x2) (20LE) للحموضة مرة واحدة

Ranitidine (أرخص)

Famotin 20mg (tab) for recurrence مرة واحدة ليلاً

Peptic ulcer :

Omepral (cap) كبسولة قبل الأكل مرة واحدة يومياً لمدة شهر

Conaz (10tab) 16LE قرص 3 مرات يومياً

Gastrofait 500 , 1000 قبل الفطار والعشاء
(tab)

Peptic ulcer for 2 w :

Omepral cap 4w كبسولة مرة واحدة يومياً قبل العشاء

Claribiotic 500 cap كبسولة كل 12 ساعة

Amrizole قرص كل 12 ساعة

الديدان

* البلهارسيا :

Distocide 600 mg (tab) during meals 20-40mg/kg 1 or 2 doses

*Tinea saginata & soleum H nana

Yomesan (mirazid cap)

أقراص للمضغ تمضغ جيداً ثم تبتلع بالماء في اليوم الأول أربع أقراص مرة واحدة ثم قرصين يومياً لمدة أسبوع ويؤخذ laxel فوار بعد ذلك
كيس علي نصف كوب ماء 3 مرات يومياً

الباقى

Bendax (tab 200mg, susp

100mg/5ml قرصين مرة واحدة و strongylodiasis , taeniasis قرصين مرة واحدة يومياً لمدة 3 أيام أو 20 مل من

زجاجة 30 مل مرة واحدة يومياً ممكن يكرر بعد أسبوعين ثم أربعة

Fluvermal (susp) ملعقة كل 12 ساعة لمدة 3 أيام ممكن يكرر بعد أسبوعين ثم أربعة

Antiver قرص مرتين يومياً لمدة 3 أيام لا يؤخذ في الحمل

Hyperuricaemia & gout**Chronic:**

Zyloric (*allopurinol*) 100 , 300 mg (tab) 800-200 مجم علي جرعتين

Acute:

Urosolvine (*cholchicine*) (eff) 1x3 not with NSAIDs & renal and hepatic pts

Common cold

Night & Day (tab) 1 x 2

Cafamol (tab) 1 x 2

Congestal syrup

البرد عند الأطفال :

Rhinostop drops 1x3
Curisafe 250 susp 1 / 12h
megafen syrup 1x3

البرد عند الرضع :

Otrivin baby saline drops 2x3
Curisafe 100 drops 1 / 12h
Cetal drops , syrup 1x3

Cough**Dry:**

Codilar , sinecod (syrup)

Tuscapine (syrup)

Wet:

Bronchophan, Ventoline Expect , Guava Trix (syrup)

BroZedex (syrup)

Tusskan (syrup)

للأطفال والرضع :

sinecod syrup / 2 drops 3time الجافة
mucophylline + bisolvon + بلغم
syrup / 7 drops 3times

الكحة الجافة :

Codilar (sinecod) syrup
1½ ملعقة كبيرة 3 مرات بعد الأكل
Ventoline 2mg tab
قرص 3 مرات بعد الأكل
Vendexine syrup
ملعقة كبيرة مرتين يومياً بعد الأكل لمدة 3 أيام

الكحة المصحوبة بلغم :

Mucophylline syrup
1½ ملعقة كبيرة 3 مرات بعد الأكل
Vendexine syrup
ملعقة كبيرة بعد الأكل مرتين يومياً لمدة 3 أيام

Bronchial AsthmaO₂ 40-60 %**Stage I :Nebulizer**

2ml Normal Saline + 0.25 mg Atrovent (Ipratropium Bromide) + 2.5 mg Farcoline (salbutamol) **NB**: IF 2 amp greater improvement

Stage II :Infusion:

Glucose 5% + Solu-cortef (vial) (hydrocortisone 100mg) + amp minophylline + Bisolvon (amp)

STAGE III: inbetween attack:

- 1- **Clenil** (inhaler) 2 بخة صباحاً و 2 بخة مساءً
- 2 - **Quibron** (tab) 1/2 قرص كل 12 ساعة وتشرب سوائل كثير
- Bricanyl** (syrup) للحمل

الأزمة في الأطفال :

Minophylline ped .supp. لبوسة كل 12 ساعة
Zaditen syrup ملعقة كل 12 ساعة لمدة 6 شهور
Bisolvon drops نقط 3 مرات يومياً بعد الأكل
Apidone syrup ملعقة 3 مرات يومياً لمدة 5 أيام ولا يكرر

Anti Histaminic

Fenistil (tab, syrup)

Avil amp, tab, syrup

Topical :

Allergex (cream) 1.5LE 1x2

Non sedative

For Insect bite – urticaria – eczema – angioedema – food & drug allergy -
 allergic rhinitis – allergic conjunctivitis

Allerfen (60, 180 tab)

Claritine (Tab 10, Syrup 5) قرص مرة واحدة يومياً

Corticosteroid

Epidron (vial) حقنة عضل مرة أو أكثر حسب الحاجة

Diprophos (amp) 15LE **kenacort** (vial) عضل مرة واحدة فقط

Apidone (syrup) (dexta & chlorpheniramine) للأطفال 1/4 ملعقة 3 مرات للأكبر 1/2 ملعقة 3 مرات وللکبار ملعقة 3 مرات

Sexual**Vivecta****Vigadol**

مخدر موضعي:

Spearmint (*spray*)

للآلام الجماع للمرأة:

KY gel

لبناء العضلات:

Decadurabolin (25-50) *amp weekly***Vitamin****Biovit 12** (*amp*) (*macrocytic anaemia*) حقنة كل أسبوع في أول شهرين ثم كل شهر لمدة 3 شهور**Erthropiotin** (*vial*) 37LE (*anaemia in RF*) حقنة 1-3 مرات أسبوعياً**Neurobion** (*amp*) حقنة كل أسبوع لإلتهاب الأعصاب في كبار السن والسكر**Activate 200** (*tab*) قرصين بعد الفطار مقوللذاكرة**Vit D D3 natural 4500** (*drops*)**Ginseng GK 850** (*Cap*) **JOKAR 1200** (*Cap*) **Ginkor forte** (*cap*)

فيتامينات للرضع:

Bebe vit (*drops*) 1/2 *droper once daily*

للأطفال:

Vitamount (*syrup*) ملعقة 3 مرات يومياً قبل الأكل**LMCO seas** (*syrup*) (زيت كبدة الحوت) ملعقة 3 مرات يومياً للوقاية من الكساح

للکبار:

Supravit**Viterra plus** (فايزر) 6LE**Vitamax** (جلاكسو)

plus

Vitona plus (36 compound)**Vivamax 3** (*Cap*) تنظيم الساعة البيولوجية قرص قبل النوم

فاتح للشهية:

Tres - Orix Forte (*Syrup*) ملعقة 3 مرات قبل الأكل بنصف ساعة

بناء الأجسام:

Weight gainer (*powder*) للأطفال ملعقة علي كوب لبن وللکبار ملعقتين علي كوب لبن 3مرات يومياً

الأنيميا ونقص الكالسيوم

Osteoporosis

Evista 60 (tab) (نقص الكالسيوم (النمو والتسنين والحمل والرضاعة والياس والغسيل الكلوي ولين العظام)

Calcium Sedico (eff) (Ca, D, C) كيس فوار مرة واحدة بعد الأكل

FerroCal (cap) (Ca, D, C, Iron, Zn, Folic acid) *once daily*

Iron deficiency anaemia

Haemoton (cap) GSK 10 L£ 2-1 كبسولة مرة واحدة يوميا يناسب الحمل

Obron (40cap) pfizer 6L£ لمنع الأنيميا أثناء الحمل كبسولة مرة واحدة يوميا

Fefol (cap) (ferrous sulfate) *once daily*

لو فشل *oral* بعد 4-6 شهور نستخدم *parenteral* مثل *jectofar*

المسكنات

: للأطفال

Megafen (syrup) (pa+ibu) 2.75 L£ 3 مرات يوميا

Brufen (syrup) 4.5L£ 3x1

Novacid (syrup) 2 L£

egaskineV (supp)

Dolphin-K drops & Supp

1x1

: للكبار

Parofen (pa500+ibu400) 7.5L£ (30tab) قرص 3 مرات يوميا

DolphinK (amp) 6L£ حقنة كل 12 ساعة

Cataflam 9L£ 25/50 (10cap) كبسولة كل 12 ساعة

Indocid (cap & vial) كبسولة 3 مرات يوميا

ketolgin & Orudis amp حقنة كل 12 ساعة

mexicam & Anti cox II (7.5&15) (Cap & amp & supp) مرة واحدة بعد الأكل

: المسكنات بروشتة

Acupan (tab & amp) قرص 3 مرات / حقنة 4 مرات

Nalufin (amp) إلى 4 حقن ورید ببط أو تحت الجلد أو عضل

ITramado (amp) (n't in renal & hepatic pts)

Pethidine 50 & 100 (amp)

ANTAGONIST:

Naloxone (amp) 5-1 أمبول كل 3 دقائق حتى التحسن أو 10 مجم

Muscle relaxant

olgin My (20 cap) 10 LE كبسولة 3 مرات يومياً

Dimra (tab)

Myolastan (tab) 18 LE لتقلص العضلات الشديد

Antibiotic

Ibidroxil , Curisafe 125, 250 (drops 100, susp) 8 LE ملعقة كل 12 ساعة

Cefotax 250, 500 (vial) 6 LE حقنة كل 12 ساعة

Flumox 250, 500 (susp, vial) كل 6 ساعات

E-mox 125, 250 4.5 LE ملعقة كل 8 ساعات

Hibiotic 156, 312 15 LE (susp) ملعقة كل 8 ساعات

Seprin (Susp) ملعقة كل 12 ساعة

Erythrocin (susp) في حساسية البنسيلين / ملعقة كل 6 ساعات

الحمل :

Ceporex (125, 250, 500, 1000) (Tab 15 LE, vial 8 LE susp 10 LE) كل 6 ساعات

Cephotox (vial) كل 12 ساعة

Flumox

Emox (Cap, vial) كبسولة كل 8 ساعات

Ampicillin

الكبار :

Cefotax 1000 (vial) حقنة عضل أو وريد كل 12 ساعة

Ibidroxil 500 Cap 6 LE, 1000 Tab 9 LE كبسولة كل 12 ساعة

Flumox 500, 1000 (16 cap 12 LE, vial 6 LE) كبسولة أو حقنة كل 6 ساعات

Seprin & sutrim & Septazole Forte (tab) قرص كل 12 ساعة

Curisafe cap 1x12

Angina

During attack:

Angised 0.5 (tab) MI قرص تحت اللسان ويكرر لعدد 3 أقراص كل 10 دقائق وإلا يُحول للمستشفى

Inbetween attack:

1 - Nitrocare SR 2.5, 6.5, 9 (cap) كبسولة 3 مرات يومياً

2- Isoptin (tab) قرص 3 مرات يومياً

Hypertension

< 55 y or not black	>55 y or black
ACE Capoten 25, 50 (tab) 10 LE قرص مرتين يومياً قبل الأكل بساعة Enalapril 5, 20 (tab) 17 LE قرص مرة واحدة يومياً ± β Blocker : Ateno 50, 100 (tab) 3 LE قرص مرة واحدة مساءً	CCB: Isoptin 80 (tab) 6-1 أقراص مرتين يومياً Epilat 10, 30 (cap) 5 LE قرص 3 مرات يومياً تفرش ثم تبلع في الطوارئ ± Diuretic : Aldactazide (tab) قرص مرة واحدة يومياً Moduretic (Tab) قرص يومياً أو يوم بعد يوم 1 - 1/2

In Emergency :

If systolic is high **Lasix** 40 (5amp) 3 LE يستحسن من غير محلول

If diastolic is high **Epilat** كبسولة تحت اللسان

الحمل

Aldomet 250 (tab) قرص مرتين يومياً

hypotension

Hypotension:: sever cases give amp dexamethasone

Effortil (tab 5, drops 7.5) 4 LE 10 نقط 3 مرات يومياً

Gutron (tab, drops) 5 LE قرص 3 مرات قبل الأكل

Orthostatic Hypotension:

Fall in S ≥ 20 , D ≥ 10 (ask for ; blood sugar , urea , Hb) Standing -10/10

Astonin H (20 tab) 5 LE قرص مرة واحدة قبل الأكل

منشط للدورة الدموية :

Stugeron 25 tab 11 LE قرص صباحاً وقرص مساءً

+ **Trental** tab قرص صباحاً وقرص مساءً

+ **Ginkor forte** (cap) 22 LE كبسولة 3 مرات بعد الأكل

Meniere :

Betaserc 8, 16 tab قرص 2-3 مرات يومياً

+ **Vascular** cap كبسولة كل 12 ساعة بعد الأكل

: لوقف النزيف**Konakion** 5 amp 35LE حقنة عضل كل 12 ساعة**: لتصريف الكدمات****Alphintern** 20 tab 12LE قرص مرتين يومياً**: منشط لأداء المخ****Nootropil** (200 syrup, 400 cap, 800 tab, 1000 amp) 12LE 3-2 مرات يومياً**: مضاد للاكتئاب****Fluoxetine** cap كبسولة مرة واحدة يومياً**: الجلطة****Clexane** 20,40,60,80 40-80u /sc/12h prophylactic 20-40 u / sc /12h**Epileps****partial***Simple, complex***Tegretol** tab 200, CR100, CR400 Syrup100

<1 y 100-200 1-5 y 200-400

5-10 y 400-600 10-15 y 600-1000 على مرتين

Generalized*Grand mal, absence, tonic clonic, myoclonic***Depakine** 200 tab **depakine chrono** once daily

15 – 30 mg /kg/day

: التهاب الأعصاب**Gaptin** 100, 300, 400 cap كبسولة مرة واحدة يومياً**: التبول الليلي****Uripan** (tab, syrup) 9LE قرص أو ملعقة عند النوم**Minirin** (nasal spray) 103 LE بخة عند النوم مع رفع الرأس**Tofranil** (10, 25 tab) 2LE 2-1 قرص قبل النوم**: المهدئة****Buspar** 10, 15 (tab) 11 LE 5 مجم (1/2 قرص) 3 مرات يومياً 3 مرات يومياً**Neuril** 2, 5, 10 (tab, amp) 2LE قرص 3 مرات يومياً**Anti fungal****: Systemic****Fungican** (1cap) 10LE كبسولة مرة واحدة لفطريات المهبل**Arozole** 100 (14 cap) 56 LE *Vulvovaginitis* 200 mg /2 daily/ 7 days*P. versicolor* 200 mg / 1daily /7days*Dermato* 200mg/ 1daily / 7days**Kizole** (10 tab) 18 LE قرص مرة واحدة أثناء الأكل لمدة أسبوع على الأقل**Griseovin** (susp) ملعقة صغيرة 3 مرات يومياً**Bacterial vaginal infection****Bidalkin** powder

كيس على لتر ماء بارد مرتين يومياً

Betadine supp 1x1x7**Amrizole** 500 tab

قرص 3 مرات بعد الأكل

Ibidroxil cap 1/2/7

Topical:

Closol (spray) 6.5 LE candida مرتين يومياً

Trosyd (cream, solution for hairy areas) 8LE tinea

Fungiban (lamisil) (gel) مرتين يومياً

Daktarin (cream) 6LE

Vaginal fungal infection:

Flucoral 150 mg كبسولة أسبوعياً لمدة أسبوعين

Betadine vaginal douch كيس علي لتر ماء مرتين

Gynotrosyd vaginal supp 3 مرات يومياً

روشتة التنينيا:

Griseovin ملعقة 3 مرات يومياً

Nizoral (curazole H) shampoo مرتين أسبوعياً يوضع علي الشعر 10 دقائق

Lamisil (cream) 15 LE

Vaginal:

Gynetrotyd (vaginal tab, مرة واحدة يومياً لمدة 3 أيام ويكرر أن لم يتحسن 3 أيام أخرى

Amrizole N (vaginal supp) candida cream لبوسة مرة واحدة لمدة أسبوعين

Canesten (vag. Tab100, 500) قرصين في المهبل مرة واحدة لمدة 3 أيام

Betadine (vaginal douch)

Premarin (cream) (estrogen لتقليل أعراض سن اليأس) مرة واحدة لمدة 24 يوم كل شهر

Instead of premarin we can use cidolut nor and can be used to delay menses 1 tab 3 times daily 5 days before

Topical corticosteroid: eczema +itching

Cream → Once daily

Oint → Twice daily

Betnovate (cream, oint) 5LE (high potency)

Betaderm (cream, oint) 2.5LE (intermediate potency)

Locasalen (ointment) 4LE, diprosalic (cream 4 LE, lotion 9LE) (CST + Salicylate)

للعلاج الصدفية والأكزيما المستعصية ليس بها كورتيزونات:

When CST is CI as infants, children, pregnancy, DM in long term therapy

Bioclear (lotion, gel) 4 LE مرتين يومياً

Elidel 120LE مرتين يومياً

When infection is superadded:

Quadriderm (cream) 4.5LE مرتين يومياً

bed sores, skin ulcer:

Rofa gel 27LE

Warts, corns:

Collomack paint 6.5LE مرتين يومياً

إلتهاب الحفاض:

Baby quard cream مرتين أو عند تغيير الحفاض

Kenacomb cream 2-1 مرة يومياً

Wound healing :**Mebo** (cream) 16 £E**Iruxol** (oint) 20 £E 1 X 1 X 8 W**تشققات الجلد****Hipanten** (cream) 6£E 1X2**Panthenol** (cream)**Purelan** (cream) تشققات الحلمة**الحروق :****Betadine** (solution , oint) 2 £E ليس في الحمل**Dermazine** (cream) 3£E**Fucidine** (cream , oint) topical antibiotic 1 x 2-3**Sofratull gauz****Topical antiviruses :****Novirus** (cream) كل أربع ساعات**Mouth wash :****Betadine** MW 3مرات لمدة 3 دقائق**Oracin****Tantum verde****: أقراص إستحلاب****Stripsore** 24 loz 10 £E**Tantum verde P** 20 Loz 3 £E**Candy** 22 loz 15 £E**ZoraC** 3 £E*NB: Cream is used for face and wet skin but ointment is used for dry skin***Oral antifungal:** **Betadine** MW 3min/3times +**Daktarin** (Oral gel) 18 £E**Miconaz** (oral gel) 5£E 1/2 children / 1/4 ملعقة 4 مرات يومياً**Fungistatin** (oral susp) 4£E**Nystatin** (oral drops) 4£E 3مرات بعد الأكل 4مرات يومياً**Oral ulcers :****Salivex - L** (Paint) 5£E**Mundisal** (gel) 6£E**Gonorrhea:****Cefobid** vial حقنة واحدة عضل ولا تكرر**Rimactane** 300 cap كبسولة كل 8 ساعات لمدة 3 أيام**Urisept** قرص 3 مرات بعد الأكل**رائحة الفم الكريهة:****Betadine** MW**Vibramycin** cap 1/1/10 after food by 1 h**Amrizole** 250 tab 3مرات بعد الأكل

: ألم الأسنان

Dentocalm (oint) 1.5LE

Intertrigo :

Calamine lotion 3مرات يومياً

+ **Betnovate** (Quadriderm)

Local analgesis :

Voltarin (gel) 5 LE 1x3

Ketolgin (gel) 3LE 1x3

Felden (gel) 6.5LE CI in pregnancy, lactation

Radian massage cream

Rubralgin (cream) 2LE

: طبيعى للإحتقان

Robb (oint) 3LE

Sunscreen :

Luna 7 lotion 34LE

منع مص الأظافر

No Habit (lotion) 10LE

: الكدمات

Hemoclar (oint) 5.5LE 3X1

Reparil - n (gel) 9LE

Acne : **Sacnel** (soap) ± oral antibiotic + يمسح الوجه 5 دقائق ثم يغسل بالماء

Inflammatory :

Acne benz 13.5LE يخلط كمية من الأنثوبنتين ثم يدهن مرتين صباحاً ومساءً بعد غسيل الوجه بالماء الدافئ

Non inflammatory :

Acne - free 0.25, 0.5, 0.1 cream 5LE CI IN pregnancy (teratogenic) يوضع مساءً ويغسل صباحاً

: تفتيح لون البشرة

Olay

Fair & lovely

Scar:

Contractubex (gel) 18LE 3مرات يومياً لو *hard* يظل طوال الليل

قشر الشعر

1-Curazole H (shampoo) 12LE مرتين اسبوعياً ويترك 5 دقائق

2-Rootage (cream) يوم بعد يوم

مغذى للشعر

Pantene (shampoo)

سقوط الشعر**Hair stabil** (*shampoo*) 10LE يوم بعد يوم**Tonoscalpine** (*lotion*) 9LE يوم بعد يوم علي شعر مبلل**For Hair & Nail** (*Cap*) 9LE كبسولة مرتين يومياً لمدة ثلاث شهور**Scabies :****Eurax** (*cream , lotion*) 6LE مرة واحدة لمدة 3 أيام**Sulphur** (*soap*) يوضع على الجسم ويغسل بليفة خشنة ويتم للبيت كله**القمل****Licid****Eurax****P.resea****Rosagel** (*gel*) مرتين يومياً**للإحتقان****Afrin** (*drops , spray , ped drops*) 3LE 1x2**Otrivin** (*drops , spray , ped drops*) 5LE 1x2**New born : lyse** (*otrivin baby saline*) (*drops*) 2LE 1x3**Snoring :****Snore no more** (*nasal spray*) 45LE 2بخة قبل النوم**حساسية الأنف****Nasotal** (*drops, spray*) 6LE 1X3**Eye & ear****Antibiotic :****Terramycin** (*eye oint*) 2LE قبل النوم**Tobralex** (*oint , drops*) 5LE كل 6 ساعات**Ocuflox** (*drops*) 4.5LE 4مرات يومياً لأقل من 10 أيام**Ciprocin** 4مرات يومياً**corneal ulcer** (*drops , oint*) 5LE نقطتين كل ربع ساعة أول يوم ثم كل ساعة ثانياً يوم ثم كل 4 ساعات ثالث يوم &**otitis externa** 3نقط كل أربع ساعات**polyspectran** *drops* 6.5LE 1 /4-6h**Trachoma :****Isoptocetamide** (*drops*) 5LE *acute* كل ساعتين *chronic* كل 4 ساعات**Sinusitis:****Diprofos amp** حقنة عضل مرة واحدة ولا تكرر**Ciprofar 500** قرص كل 12 ساعة**Clarinate tab** قرص كل 12 ساعة **chronic****Nasotal spray** كل 12 ساعة **chronic****Flixonase spray** كل 12 ساعة **chronic****Cataflam 50** قرص كل 12 ساعة**Acute Allergic rhinitis:****Clarinate tab** قرص كل 12 ساعة**Nasotal spray** كل 12 ساعة**± antibiotic ± afrin**

Decongestant :**Visine** (drops) 5LE 3مرات**Prisoline** (naphazolin + chlphenamine) (drops) 3LE 3مرات للحساسية والإحمرار**Lubricants :****Liquifilm tears** (drops) 2LE**Glaucoma :****Timolol** 0.25, 0.5 مرة واحدة**Cosopt** 74 LE 1x2

مخدر لعمليات العين مثل الرايش

Benox (drops) 4LE**Allergy :****Opticure** (drops) 3مرات**Antibiotic for ear only :****Cidocetin** (chlramphenicol) (ear drops) 1 x 3 x 7**Ear Wax & pain :****Ear Cure** (drops) 2 x 3**+ Ear wax** (drops) 2 x 3 x 3**التهاب الأذن الوسطى والخارجية :****Polyspectran drops** 2-1 نقطة 3مرات**Ear cure drops** 2-1 نقطة 3مرات يومياً**Bactiolor** 500 cap/ 8h/10days**or Curisafe** 500 cap كبسولة كل 12 ساعة**Cataflam** 50 cap مرتين يومياً**allergex for itching** وفي الأذن الخارجية نضيف**First aid in burn :****1st, 2nd degree:****Betadine + dermazine +sofratull****(gauze)+ibidroxil+iruxol+avil****3rd degree:****1 – cannula and Ringer****2 – avil amp + epidron + tetanus(do allergy)****3 – analgesia (nalufin)****4 – eye drops (terramycin)**

تم بحمد الله وفضله